

Heivlinder - Jaarverslag 2013

Anton Baaijens

Van de heivlinder werden in 2013 67 waarnemingen verzameld met in totaal 250 getelde exemplaren.

De uitzonderlijk mooie zomer van 2013 was voor de heivlinder ongetwijfeld gunstig, want de heivlinder had een goed jaar met een waarnemingsgemiddelde van 3,7 exemplaren per waarneming. Dit is opmerkelijk hoger dan in de jaren 2002 tot en met 2012. Alleen 2005 sprong er ver bovenuit met een gemiddelde van 8,5. Toch vloog de heivlinder in de atlasperiode van 1993 tot en met 2002 in beduidend hogere aantallen. Het gemiddelde over die jaren was namelijk 7,2 en de minste jaren waren toen 1997 en 1998 met respectievelijk gemiddeld 3,6 en 3,3 exemplaren per waarneming.


De conclusie is dus dat wat slechts nog maar 10-15 jaar geleden een slecht jaar voor de heivlinder was, tegenwoordig een goed jaar voor de heivlinder is. Oftewel: de heivlinder is anno 2013 vrijwel overal in de duinen van Zeeland nog wel aanwezig, maar de aantallen zijn in 10-15 jaar tijd wel sluipenderwijs gehalveerd!

De meeste heivlinders werden in 2013 geteld op Walcheren in de duinen aan de zuidwestkust, tussen Vlissingen en Domburg. Het waarnemingsgemiddelde bedroeg 3,7 per waarneming. Alhoewel aan de noordwestkust van Walcheren minder heivlinders werden geteld was het waarnemingsgemiddelde met 4,3 daar wel duidelijk hoger. Op Neeltje Jans werden enkele mooie waarnemingen gedaan van in totaal 24 exemplaren. Op 8 september telde Alex Wieland daar 15 exemplaren tegelijk. In West Zeeuws-Vlaanderen werd slechts één waarneming gedaan in het Zwin, maar Pepijn Calle telde daar wel 9 exemplaren tegelijk. De hoogste aantallen werden geteld op 14 augustus in de duinen van Oranjezon: Rienk Geene telde toen 28 vlinders. Jo en Heleen Clarijs schrijven over een schatting van vele honderden heivlinders in Oranjezon, ook op 14 augustus: “de heivlinder was op die dag de dominante soort”.


Van het duingebied op Schouwen Duiveland komen opvallend weinig meldingen; slechts 8 waarnemingen werden verzameld van 10 heivlinders. Kennelijk zijn er in de zomer weinig waarnemers in het duingebied geweest. Daarbij moet worden vermeld dat het omvangrijke duingebied van Schouwen vrij matig ontsloten is door wandelpaden. De primaire duinen, waar vaak de meeste heivlinders vliegen, zijn bovendien ver verwijderd van parkeerplaatsen waardoor flinke afstanden gelopen moeten worden.

Heivlinder in Zeeland

	waarnemingen	exemplaren	gemiddelde
Atlasperiode 1993 t/m 2002			7,2
2004	23	31	1,3
2005	17	145	8,5
2006	17	21	1,2
2007	7	12	1,7
2008	6	14	2,3
2009	13	38	2,9
2010	12	27	2,3
2011	19	31	1,6
2012	40	75	1,9
2013	67	250	3,7
duinen Schouwen Duiveland	8	10	1,3
duinen zuidwest Walcheren	35	130	3,7
duinen noordwest Walcheren	17	73	4,3
Neeltje Jans	4	26	4,0
Zeeuws-Vlaanderen	1	9	9
Noord- Beveland Veersedam	2	2	1



De heilvinder werd in 2013 in 27 kilometerhokken waargenomen



Pas vanaf eind juli werden heilvindlers gezien



Cruciaal voor de heilvinder is de beschikbaarheid van voldoende voortplantingsbiotopen. Dat zijn schrale duintjes met voldoende waardplanten voor de rupsen: in dit geval voornamelijk polletjes buntgras.

Hipparchia semele

